療法名	薬剤名	略語	投与量	投与経路·時間	投与日	1コース
			1.25m²未満→80mg/日			
S-1療法 	TS-1	S-1	1.25m ² 以上1.5m ² 未満→100mg/日 1.5m ² 以上→120mg/日	内服 1日2回	Day1~28 (4週間投薬2週間休薬)	42日
S-1療法	TS-1	S-1	1.25m²未満→80mg/日 1.25m²以上1.5m²未満→100mg/日 1.5m²以上→120mg/日	内服 1日2回	Day1~14 (2週間投薬1週間休薬)	21日
	ユーゼル	LV	75mg/日			
UFT+LV療法	UFT	UFT	300mg/m²/日 ※ 1.17m²未満→300mg/日(100-100-100) 1.17m²以上1.49m²未満→400mg/日(200-100-100) 1.50m²以上1.83m²未満→500mg/日(200-200-100)	内服 1日3回(食事前後1時間避ける)	Day1~28 (4週間投薬1週間休薬)	35日
			1.83m ² 以上→600mg/日(200-200-200) <b法></b法>			
Capecitabine療法	ゼローダ	Cape	1.33m ² 未満→3000mg/日 1.33m ² 以上1.57m ² 未満→3600mg/日 1.57m ² 以上1.81m ² 未満→4200mg/日 1.81m ² 以上→4800mg/日	内服 1日2回	Day1~14 (2週間投薬1週間休薬)	21日
	レボホリナート	I-LV	200mg/m ²	点滴静注 2時間	Day1	
mFOLFOX6療法	エルプラット	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注 2時間	Day1	14日
	5-FU	5-FU	400mg/m ²	急速静注 全開(5分)	Day1	
	5-FU レボホリナート	5-FU I-LV	2400mg/m ²	持続静注 46時間 点滴静注 2時間	Day1~2	
	エルプラット	L-OHP	200mg/m ² 85mg/m ²	点滴静注 2時間	Day1 Day1	
mFOLFOX6+BV療法	5-FU	5-FU	400mg/m ²	急速静注 全開(5分)	Day1	14日
	5-FU	5-FU	2400mg/m ²	持続静注 46時間	Day1~2	
	ベバシズマブ	BV	5mg/kg	点滴静注 初回1時間30分、2回目1時間、3回目以降30分	Day1	
	レボホリナート	I-LV	200mg/m ²	点滴静注 2時間	Day1	
mFOLFOX6	エルプラット	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注 2時間	Day1	
+Cetuximab療法	5-FU	5-FU	400mg/m ²	急速静注 全開(5分)	Day1	14日
	5-FU	5-FU	2400mg/m ²	持続静注 46時間	Day1~2	-
	アービタックス レボホリナート	C-mab I-LV	初回: 400mg/m² ·2回目以降: 250mg/m²	点滴静注 初回2時間、2回目以降1時間	Day1.8	
	エルプラット	L-OHP	200mg/m ² 85mg/m ²	点滴静注 2時間 点滴静注 2時間	Day1 Day1	
mFOLFOX6	5-FU	5-FU	400mg/m ²	急速静注 全開(5分)	Day1	14日
+Panitumumab療法	5-FU	5-FU	2400mg/m ²	持続静注 46時間	Day1~2	
	ベクティビックス	P-mab	6mg/kg	点滴静注 1時間(※1000mg/日を超える場合は1時間30分)	Day1	
	レボホリナート	I-LV	200mg/m ²	点滴静注 2時間	Day1	- 14日
FOLFIRI療法	イリノテカン	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注 1時間30分	Day1	
I OLI II II II II II	5-FU	5-FU	400mg/m ²	急速静注 全開(5分)	Day1	
	5-FU	5-FU	2400mg/m ²	持続静注 46時間	Day1∼2	14日
	レボホリナート	I-LV	200mg/m ²	点滴静注 2時間	Day1	
FOLFIRI+BV療法	イリノテカン 5-FU	CPT-11 5-FU	150mg/m ²	点滴静注 1時間30分 急速静注 全開(5分)	Day1 Day1	
	5-FU	5-FU	400mg/m ² 2400mg/m ²	持続静注 46時間	Day1 ~2	
	ベバシズマブ	BV	5mg/kg	点滴静注 初回1時間30分、2回目1時間、3回目以降30分	Day1	
	レボホリナート	I-LV	200mg/m ²	点滴静注 2時間	Day1	14日
	イリノテカン	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注 1時間30分	Day1	
FOLFIRI+Cetuximab療 法	5-FU	5-FU	400mg/m ²	急速静注 全開(5分)	Day1	
<i>/</i>	5-FU	5-FU	2400mg/m ²	持続静注 46時間	Day1∼2	
	アービタックス	C-mab	初回:400mg/m² ·2回目以降:250mg/m²	点滴静注 初回2時間、2回目以降1時間	Day1.8	
	レボホリナート	I-LV	200mg/m ²	点滴静注 2時間	Day1	14日
FOLFIRI	イリノテカン	CPT-11 5-FU	150mg/m ²	点滴静注 1時間30分 急速静注 全開(5分)	Day1	
+Panitumumab療法	5-FU 5-FU	5-FU	400mg/m ² 2400mg/m ²	持続静注 46時間	Day1 Day1∼2	
	ベクティビックス	P-mab	2400mg/m ⁻ 6mg/kg		Day1~2 Day1	
FOLFIRI +Ramucirumab療法	レボホリナート	I-LV	200mg/m ²	点滴静注 2時間	Day1	14日
	イリノテカン	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注 1時間30分	Day1	
	5-FU	5-FU	400mg/m ²	急速静注 全開(5分)	Day1	
	5-FU	5-FU	2400mg/m ²	持続静注 46時間	Day1∼2	
	サイラムザ	R-mab	8mg/kg	点滴静注 1時間	Day1	
FOLFIRI +Aflibercept療法	レボホリナート イリノテカン	I-LV CPT-11	200mg/m ²	点滴静注 2時間 点滴静注 1時間30分	Day1 Day1	14日
	1-7/テカン 5-FU	5-FU	150mg/m ² 400mg/m ²	急速静注 全開(5分)	Day1	
	5-FU	5-FU	2400mg/m ²	持続静注 46時間	Day1~2	
	ザルトラップ	Afli	4mg/kg	点滴静注 1時間	Day1	
CPT-11+Cetuximab療	イリノテカン	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注 1時間30分	Day1.	14日
法	アービタックス	C-mab	初回:400mg/m² •2回目以降:250mg/m²	点滴静注 初回2時間、2回目以降1時間	Day1.8	1411
	イリノテカン	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注 1時間30分	Day1	14日
CPT-11			6mg/kg	点滴静注 1時間(※1000mg/日を超える場合は1時間30分)	Day1	14日
CPT-11 +Panitumumab療法	ベクティビックス	P-mab		ト・ナ ±// ・	1	
CPT-11	ベクティビックス イリノテカン	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注 1時間30分	Day1	14日
CPT-11 +Panitumumab療法	ベクティビックス			点滴静注 1時間30分 点滴静注 初回1時間30分、2回目1時間、3回目以降30分 点滴静注 初回2時間、2回目以降1時間	Day1 Day1 Day1	7日
CPT-11 +Panitumumab療法 CPT-11+BV療法	ベクティビックス イリノテカン ベバシズマブ	CPT-11 BV	150mg/m ² 5mg/kg	点滴静注 初回1時間30分、2回目1時間、3回目以降30分	Day1	
CPT-11 +Panitumumab療法 CPT-11+BV療法 Cetuximab療法	ベクティビックス イリノテカン ベバシズマブ アービタックス ベクティビックス レボホリナート	CPT-11 BV C-mab	150mg/m ² 5mg/kg 初回:400mg/m ² •2回目以降:250mg/m ²	点滴静注 初回1時間30分、2回目1時間、3回目以降30分 点滴静注 初回2時間、2回目以降1時間	Day1 Day1	7日
CPT-11 +Panitumumab療法 CPT-11+BV療法 Cetuximab療法	ベクティビックス イリノテカン ベバシズマブ アービタックス ベクティビックス	CPT-11 BV C-mab P-mab	150mg/m ² 5mg/kg 初回:400mg/m ² •2回目以降:250mg/m ² 6mg/kg	点滴静注 初回1時間30分、2回目1時間、3回目以降1時間 点滴静注 初回2時間、2回目以降1時間 点滴静注 1時間(※1000mg/日を超える場合は1時間30分)	Day1 Day1 Day1	7日

	レボホリナート	I-LV	200mg/m ²	点滴静注 2時間	Day1	
sLV5FU2+BV療法	5-FU	5-FU		急速静注 全開(5分)	Day1	
	5-FU	5-FU	400 mg/m ²			14日
			2400mg/m ²	点滴静注 46時間 点滴静注 初回1時間30分、2回目1時間、3回目以降30分	Day1~2	
	ベバシズマブ	BV	5mg/kg		Day1	
sLV5FU2 +Panitumumab療法	レボホリナート	I–LV	200mg/m ²	点滴静注 2時間	Day1	
	5-FU	5-FU	400mg/m ²	急速静注 全開(5分)	Day1	14日
	5-FU	5-FU	2400mg/m ²	持続静注 46時間	Day1∼2	
	ベクティビックス	P-mab	6mg/kg	点滴静注 1時間(※1000mg/日を超える場合は1時間30分)	Day1	
XELOX療法	エルプラット	L-OHP	130mg/m^2	点滴静注 2時間	Day1	
			<c法> 1.36m²未満→2400mg/日</c法>			21日
	ゼローダ	Cape	1.36m ² 以上1.66m ² 未満→3000mg/日 1.66m ² 以上1.96m ² 未満→3600mg/日 1.96m ² 以上→4200mg/日	内服 1日2回 	Day1(夕)~Day15(朝) (2週間投薬1週間休薬)	
XELOX+BV療法	ベバシズマブ	BV	7.5mg/kg	点滴静注 初回1時間30分、2回目1時間、3回目以降30分	Day1	21日
	エルプラット	L-OHP	130mg/m ²	点滴静注 2時間	Day1	
	ゼローダ	Cape	<c法> 1.36m²未満→2400mg/日 1.36m²以上1.66m²未満→3000mg/日 1.66m²以上1.96m²未満→3600mg/日</c法>	内服 1日2回	Day1(夕)~Day15(朝) (2週間投薬1週間休薬)	
	ベバシズマブ	BV	1.96m ² 以上→4200mg/日	点滴静注 初回1時間30分、2回目1時間、3回目以降30分	David.	
	ヘハシスマノ	BV	7.5mg/kg <c法></c法>	点淌評注 初回1時间30万、2回日1時间、3回日以降30万	Day1	
Capecitabine+BV療法	ゼローダ	Cape	1.36m ² 未満→2400mg/日 1.36m ² 以上1.66m ² 未満→3000mg/日 1.66m ² 以上1.96m ² 未満→3600mg/日 1.96m ² 以上→4200mg/日	内服 1日2回	Day1(夕)~Day15(朝) (2週間投業1週間休業)	21日
	イリノテカン	CPT-11	125mg/m ²	点滴静注 1時間30分	Day1.15	
IRIS療法	TS-1	S-1	1.25m²未満→80mg/日 1.25m²以上1.5m²未満→100mg/日	内服 1日2回	Day1(夕)~Day15(朝)	28日
			1.5m ² 以上→120mg/日		(2週間投薬2週間休薬)	
SOX療法	エルプラット	L-OHP	130mg/m ²	点滴静注 2時間	Day1	
	TS-1	S-1	1.25m²未満→80mg/日 1.25m²よ満→100mg/日	内服 1日2回	Day1(夕)~Day15(朝)	21日
SOX+BV療法	エルプラット	L-OHP	1.5m ² 以上→120mg/日 130mg/m ²	点滴静注 2時間	(2週間投藥1週間休薬) Day1	
	TS-1	S-1	1.25m ² 未満→80mg/日 1.25m2以上1.5m2未満→100mg/日	内服 1日2回	Day1(タ)~Day15(朝)	21日
			1.5m ² 以上→120mg/日		(2週間投薬1週間休薬)	
	ベバシズマブ	BV	7.5mg/kg	点滴静注 初回1時間30分、2回目1時間、3回目以降30分	Day1	
SOX+Cetuximab療法	セツキシマブ	Cmab	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²	点滴静注 初回2時間 2回目以降1時間	Day1.8.15	
	オキサリプラチン TS-1	L-OHP S-1	130mg/㎡ 1.25㎡未満:80mg/日 1.25以上1.5㎡未満:100mg/日	点滴静注 2時間	Day1 Day1(夕)~Day15(朝)	21日
S-1+BV療法			1.5㎡以上:120mg/日 1.25㎡ ² 未満→80mg/日	Fink (DZE	(2週間投薬1週間休薬)	42日
	TS-1	S-1	1.25m ² 以上1.5m ² 未満→100mg/日 1.5m ² 以上→120mg/日	内服 1日2回	Day1(夕)~29(朝) (4週間投薬2週間休薬)	
	ベバシズマブ	BV	5mg/kg	点滴静注 初回1時間30分、2回目1時間、3回目以降30分	Day1.15.29	
SIRB療法	TS-1	S-1	1.25m ² 未満→80mg/日 1.25m ² 以上1.5m ² 未満→100mg/日	内服 1日2回	Day1(夕)~Day15(朝)	01 🗆
	/II /= ±>	ODT 11	1.5m ² 以上→120mg/日	上海整件(叶即20八	(2週間投薬1週間休薬)	210
	イリノテカン	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注 1時間30分	Day1	
	ベバシズマブ	BV	7.5mg/kg	点滴静注 初回1時間30分、2回目1時間、3回目以降30分	Day1	
TAS102+BV療法	ロンサーフ	TAS-1	5mg/kg 1.07m²未満→70mg/日 1.07m²以上1.23m²未満→80mg/日 1.23m²以上1.38m²未満→90mg/日 1.38m²以上1.53m²未満→100mg/日 1.53m²以上1.69m²未満→110mg/日 1.69m²以上1.84m²未満→120mg/日 1.84m²以上1.99m²未満→130mg/日 1.99m²以上2.15m²未満→140mg/日 2.15以上→150mg/日	点滴静注 初回1時間30分、2回目1時間、3回目以降30分 内服 1日2回	Day1.15 Day1(タ)~6(朝)、9(タ)~13(朝) (5日間内服2日間休薬を2クール行い、14日間休薬)	28日
FOLFOXIRI+BV療法 (導入療法)	ベバシズマブ	BV	5mg/kg	点滴静注 初回1時間30分、2回目1時間、3回目以降30分	Day1	14日
	イリノテカン	CPT-11	165mg/m ²	点滴静注 1時間	Day1	
	エルプラット	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注 2時間	Day1	
	レボホリナート	I-LV	200mg/m ²	点滴静注 2時間	Day1	
	5-FU	5-FU	3200mg/m ²	持続静注 48時間	Day1-2	
I-LV+FU+BV療法 (FOLFOXIRI+BV療法 の維持療法)	ベバシズマブ	BV	5mg/kg	点滴静注 初回1時間30分、2回目1時間、3回目以降30分	Day1	14日
		I-LV	200mg/m ²	点滴静注 2時間	Day1	
	5-FU	5-FU	3200mg/m ²	持続静注 48時間	Day1-2	
n	パージェタ	_	初回840mg/body 2回目以降420mg/body		Day1	01 🖸
Pertuzumab+Trastuzumab療	ハーセプチン	_	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	点滴静注 初回1時間30分 2回目以降30分	Day1	21日
Encorafenib+ Binimetinib+ Cetuximab療法	ビラフトビ	_	300mg/日	内服 1日1回	Day1-7	
	メクトビ		90mg/日	内服 1日2回	Day1(夕)-8(朝)	7日
	アービタックス	Cmab	400mg/m² 2回目以降250mg/m²	点滴静注 初回2時間 2回目以降1時間		
	/ レフノノヘ	Jillau	1400mg/m Ziri H 以踩ZOUMg/m	M / 19 17 / 工 初凹 2 时间 2 凹 日 以降 1 時間	Day I	