

■ 膵がん 化学療法院内登録レジメン ■

(2021.9.18現在)

療法名	薬剤名	略語	投与量	投与経路・時間	投与日	1コース
GEM療法	ゲムシタビン	GEM	1000mg/m ²	点滴静注 30分	Day1.8.15	28日
S-1療法	TS-1	S-1	1.25m ² 未満→80mg/日 1.25m ² 以上1.5m ² 未満→100mg/日 1.5m ² 以上→120mg/日	内服 1日2回	Day1~28 (4週間投薬2週間休薬)	42日
S-1療法	TS-1	S-1	1.25m ² 未満→80mg/日 1.25m ² 以上1.5m ² 未満→100mg/日 1.5m ² 以上→120mg/日	内服 1日2回	Day1~14 (2週間投薬1週間休薬)	21日
GEM+S-1 (60~100mg/日)療法	ゲムシタビン	GEM	1000mg/m ²	点滴静注 30分	Day1.8	21日
	TS-1	S-1	1.25m ² 未満→60mg/日 1.25m ² 以上1.5m ² 未満→80mg/日 1.5m ² 以上→100mg/日	内服 1日2回	Day1~14 (2週間投薬1週間休薬)	
GEM+S-1 (80~120mg/日)療法	ゲムシタビン	GEM	1000mg/m ²	点滴静注 30分	Day1.8	21日
	TS-1	S-1	1.25m ² 未満→80mg/日 1.25m ² 以上1.5m ² 未満→100mg/日 1.5m ² 以上→120mg/日	内服 1日2回	Day1~14 (2週間投薬1週間休薬)	
FOLFIRINOX療法	エルブラット	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注 2時間	Day1	14日
	レボホリナート	I-LV	200mg/m ²	点滴静注 2時間	Day1	
	イリノテカン	CPT-11	180mg/m ²	点滴静注 1時間30分	Day1	
	5-FU	5-FU	400mg/m ²	急速静注 全開(5分)	Day1	
	5-FU	5-FU	2400mg/m ²	持続静注 46時間	Day1~2	
GEM+Erlotinib療法	ゲムシタビン	GEM	1000mg/m ²	点滴静注 30分	Day1.8.15	28日
	タルセバ		100mg/日	内服 1日1回食後2時間	Day1~28	
GEM+nab-PAC療法	ゲムシタビン	GEM	1000mg/m ²	点滴静注 30分	Day1.8.15	28日
	アブラキサン	nab-PAC	125mg/m ²	点滴静注 30分	Day1.8.15	
NaI-IRI+5FU/I-LV療法	レボホリナート	I-LV	200mg/m ²	点滴静注 2時間	Day1	14日
	オニバイド	NaI-IRI	70mg/m ²	点滴静注 1時間30分	Day1	
	5-FU	5-FU	2400mg/m ²	持続静注 46時間	Day1~2	